

مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی شامل: اسید، قلیا و شوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری

۱. سومین علت شایع مسمومیت های حاد در کشور مسمومیت با سموم کشاورزی بخصوص ارگانوفسفره ها میباشد.

۲. ابتدا برچسب روی ظروف سموم دفع آفات و بروشور ان را کاملا مطالعه کنید سپس جهت استفاده دقیقا مطابق دستور، عمل نمایید.

۳. هرگز سموم دفع آفات در ظروف مشابه مواد خوراکی و آشامیدنی (مانند بطری نوشابه) نگهداری نکنید.


۴. در هنگام سم پاشی مزارع، باغات و باغچه ها حتما از ماسک، دستکش و لباس مناسب استفاده نمایید.

۵. در صورت تماس سموم دفع آفات با پوست، ناحیه الوده را با مقادیر فراوان آب و صابون شستشو دهید.



۶. علائم و نشانه های مسمومیت با گروه مهمی از حشره کش ها (موسوم به ترکیبات ارگانوفسفره) با تهوع، استفراغ، دردهای شکمی، اسهال، ریزش اشک، اریزش از بینی، تعریق، تنگی نفس، افت فشارخون، تنگی مردمک چشم، اختلالات قلبیوعصبی همراه است.

۷. باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی مشکل بزرگی برای سلامت جوامع است و میتواند منجر به عوارضی مانند ایجاد انواع سرطان، کاهش ضریب هوشی کودکان، ناهنجاری ژنتیکی در جنین، ناباروری و... شود.



۸. هنگام استفاده از مواد سفیدکننده و یا جرم بر در سرویس های بهداشتی درب و پنجره را باز گذاشته و هواکش را روشن نمایید.

۹. در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده های شوینده و پاک کننده پنجره ها را باز کنید تا هوا به خوبی در محیط جریان داشته باشد. ۱۰. از اختلاط مواد شیمیایی مانند جوهرنمک و جرم بر با فرآورده های سفیدکننده جدا خودداری کنید. بخارات و گازهای ناشی از این اختلال بسیار سمی و خفه کننده میباشد.

۱۱. در صورت تماس پوست و یا چشم با مواد اسیدی و یا قلیایی، پوست و چشم را با مقادیر فراوان آب شستشو داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید.

۱۲. در صورت تماس پوست و یا چشم با مواد اسیدی و یا قلیایی هرگز از مواد قلیایی و یا اسیدی جهت خنثی سازی استفاده نکنید.

۱۳. در صورت بلع مواد با خاصیت خوردگی مانند اسیدها و قلیاها هرگز بیمار را وادار به استفراغ نکنید. این کار میتواند سبب وخیم شدن وضع بیمار گردد.

۱۴. مسمومیت با سرب در کودکان میتواند منجر به بروز اختلالات رفتاری، کند ذهنی، اختلال در یادگیری اختلال در رشد و منجر به بروز تشنج شود.

۱۵. اگر به واسطه شغل خود با مشتقات سرب در تماس میباشید برای جلوگیری از انتقال آلودگی قبل از ورود به منزل لباس کار خود را تعویض کنید. ۲. در منازل قدیمی لوله های آب سربی و رنگ مورد استفاده در چهارچوب و دیوار که حاوی سرب است میتواند منجر به مسمومیت با سرب شود.

۱۶. شستشوی مرتب دستها در کودکان مانع تماس آلودگی سرب محیط با دهان آنها میشود.

۱۷. برخی از لوازم آرایش خصوصا غیراستاندارد و حتی سرمه حاوی مقادیر بالای سرب میباشند. از مصرف آنها خودداری کنید.

۱۸. سرب موجود در خون افراد شهرنشین بسیار بیشتر از روستاییان میباشد.

۱۹. هوای محیط نزدیک به بزرگراه ها، خاک و محیط اطراف مناطق صنعتی مانند کارخانجات باتری سازی و رنگ سازی چند برابر دیگر نقاط حاوی سرب میباشد.

۲۰. به منظور سنجش سرب در خون افراد شاغل در صنعت که با سرب تماس دارند آزمایش خون باید بطور مرتب انجام شود.

