

مسمومیت ناشی از گزیدگی ها

۱. عضو محل گزیده شده توسط مار را باید بیحرکت و هم سطح یا کمی پایین تر از سطح قلب نگه داشت.
۲. بستن یک نوار محکم و پهن چند انگشت بالاتر از محل مار گزیدگی بویژه اگر محل مار گزیدگی در دست ها و یا پاها باشد ضروری است.
۳. در مار گزیدگی بایستی از سرد کردن عضو با آب سرد و یا یخ خودداری کرد.
۴. هرچه سریعتر فرد مار گزیده را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید و زمان را با تلاش برای کشتن و یا گرفتن مار از دست ندهید.



۵. در مار گزیدگی علائم واکنش های حساسیتی شدید مانند عطسه، مشکل در تنفس یا تورم سریع و شدید، درد شکم، تهوع، سرگیجه، درد قفسه سینه، خرخر صدا و کبود شدن رنگ لب ها از جمله مواردی هستند که سریعاً باید به اورژانس مراجعه شود.
۶. مار گزیدگی در کودکان، بیماران قلبی، دیابتی، افراد مسن و معلولین حرکتی و بیماران مبتلا به آلرژی بسیار خطرناک تر است.

۷. گزش متعدد مار در ناحیه سر و گردن خطرناکتر میباشد.

۸. گزش عقرب میتواند منجر به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود اما علائم تهدیدکننده حیات و حوادث منجر به مرگ به ندرت رخ میدهد.

۹. فرد عقرب گزیده خصوصا کودکان را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل نمایید.

۱۰. تورم ناشی از گزش عقرب عموما محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی و سوزش در ناحیه گزش برای ۴ تا ۶ ساعت بوجود می آید و معمولا پس از ۲۴ ساعت بهبود میابد.



۱۱. زنبور گزیدگی ممکن است در اثر نیش انواع زنبور مانند زنبور عسل و زنبور سرخ بروز نماید.

۱۲. نیش زنبور عسل ماده به کیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی میماند و محتویات کیسه زهر به زخم منتقل میشود. بنابراین برداشتن سریع نیش از روی زخم جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است.

۱۳. علائم زنبور گزیدگی معمولا در عرض چند ساعت ناپدید میشود.