

□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
-------	-------	-------	-------

توصیه و درمان	طبقه بندی	ارزیابی
		<p><b>اگر کودک به علت حادثه یا سایر علائم جراحی فوری مراجعه کرده است:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشانه های خطر</li> <li>• رنگ پریدگی</li> <li>• خونریزی خارجی</li> <li>• علائم عفونت موضعی</li> <li>• عدم توانایی در حرکت دادن اندام</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک با سابقه سوختگی مراجعه کرده است</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نوع سوختگی ها (درجه I, II, III):</li> <li>- درجه II (سوختگی با ضخامت نسبی)</li> <li>- درجه III (سوختگی عمیق)</li> <li>• محل .....</li> <li>• درصد سوختگی .....</li> <li>• (درجه II و III) راماتیک جدول زیر مشخص کنید</li> <li>• نشانه های عفونت</li> <li>• آسیب های همراه (مثل شکستگی)</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک با سابقه بلع فراورده های نفتی مراجعه کرده است :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشانه های خطر</li> <li>• سرفه و تنفس مشکل</li> <li>• بویی که احتمال استفاده از مواد نفتی (نفت، بنزین، گازوئیل) را قطعی کند</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک با سابقه تماس یا بلع مواد سوزاننده مراجعه کرده است :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشانه های خطر</li> <li>• سوختگی دهان و یا مشکل بلع</li> <li>• بویی که احتمال استفاده از مواد سوزاننده را قطعی کند</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک با سابقه بلع مواد حشره کش ها و سموم گیاهی مراجعه کرده است:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشانه های خطر</li> <li>• مردمک تنگ شده سرسبز جافی</li> <li>• نشانه های پاراسمیپاتیک</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک با سابقه مسمومیت دارویی مراجعه کرده است :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشانه های خطر</li> <li>• علائم شوک مانند تعریق ناگهانی یا اندام های سرد</li> <li>• تنفس مشکل</li> <li>• افزایش درجه حرارت بدن (۴۲ درجه سانتیگراد یا بالاتر)</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک با سابقه مارگزیدگی مراجعه کرده است :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشانه های خطر</li> <li>• درد موضعی یا تورم</li> <li>• نکروز موضعی</li> <li>• ادرار سیاه</li> <li>• مشکل در بلعیدن و صحبت کردن</li> <li>• مشکل تنفسی</li> <li>• افتادگی پلک و فلج عضلات</li> <li>• خونریزی از لثه ها، بینی، زخم ها یا نقاط خونریزی زیر پوست</li> <li>• محل گزیدگی .....</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک با سابقه گزش حشرات ، عقرب یا رطیل مراجعه کرده است</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشانه های خطر</li> <li>• تنفس مشکل یا خرخر</li> <li>• اختلال دید</li> <li>• درد عضلانی متناوب</li> <li>• محل گزیدگی یا وجود نیش</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک با سابقه گاز گرفتگی مراجعه کرده است :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشانه های خطر</li> <li>• تب، ضعف، بی اشتها</li> <li>• ظهور ناگهانی علائم عصبی</li> <li>• مانند تحریک پذیری، ترس از آب یا نور،</li> <li>• افزایش ترشح بزاق</li> <li>• فلج شل پایین رونده</li> </ul>
		<p><b>اگر کودک توسط حیواناتی نظیر گربه ، سگ یا حیوان مشکوک به هاری گزیده یا لیسیده شده است؟</b></p>

ادامه درمان و توصیه ها □ ارجاع به ..... □	تاریخ ...../...../..... □ فرقی نگردید یا بدتر شده □ بهتر شده □	<b>در مراجعه مجدد:</b>
--	--	------------------------